

NUESTRA COMISIÓN

El Family Planning Associates Medical Group, Ltd., el principal proveedor en planificación familiar reconocido a nivel nacional, ha proporcionado servicios de planificación familiar profesionales de calidad y bajo costo para las mujeres de Chicago desde 1988.

Nuestros centros ubicados por todo Chicago ofrecen a las mujeres la atención médica de mejor calidad que existe. Médicos certificados en medicina general, obstetras y ginecólogos certificados por la Junta de Sanidad, un personal atento, enfermeras, técnicos, enfermeros especialistas, asistentes médicos y enfermeros anestesiistas, todos forman parte de un grupo comprometido a proporcionar una atención dedicada, confidencial y personal.

Creemos tanto en la educación al paciente como en la excelencia de la atención médica.

3 UBICACIONES CONVENIENTES

CENTRO DE CHICAGO (THE LOOP)
659 West Washington Street
Chicago, Illinois 60661
(312) 707-8988

NOROESTE DE CHICAGO
Albany Medical Surgical Center
5086 North Elston Avenue
Chicago, Illinois 60630
(773) 725-0200

SUR DE CHICAGO
7845 S. Cottage Grove Avenue
Suite 102
Chicago, Illinois 60619
(773) 892-0102

**ATENCIÓN DE EMERGENCIA
LAS 24 HORAS** 1+(800) 541-0356

Visítenos en Internet:
www.fpachicago.com

PÍLDORA ABORTIVA



Un grupo de profesionales médicos que proporciona atención responsable, confidencial y personal desde 1988...

El principal proveedor de atención de Chicago para casos de abortos



Family Planning Associates
Medical Group



Family Planning Associates
Medical Group



Family Planning Associates
Medical Group



La **píldora abortiva** (también llamada Mifeprex, Mifepristona o RU-486) ofrece a las mujeres una alternativa médica al aborto quirúrgico.

La Mifepristona, junto con Cytotec, fue aprobada para el uso como abortivo por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) el 28 de Septiembre de 2000. La Mifepristona es un medicamento antiprogesterona que bloquea el efecto de la progesterona, una hormona que mantiene el embarazo. La Mifepristona induce el aborto espontáneo cuando se administra al comienzo del embarazo y con una dosis posterior de Misoprostol (Cytotec), una prostaglandina.

Cómo funciona la píldora abortiva

El procedimiento de la píldora abortiva es la ingesta oral de Mifepristona, luego de la verificación, por ultrasonido, de un embarazo de 9 semanas de gestación o menos. Se toma Misoprostol en el hogar. En la mayoría de los casos, el aborto ocurre dentro de las 24 horas. Si no se presenta sangrado después de 24 horas, se repite la administración de Misoprostol. Por lo general, el sangrado se manifiesta como en un aborto espontáneo y es posible tener manchas de sangre por un máximo de dos semanas. Se usará un ultrasonido para verificar la interrupción del embarazo.

Si no ocurriera un aborto sólo con los medicamentos, deberá realizarse un aborto quirúrgico. Esta situación se da en menos del 8 por ciento de las pacientes. La ventaja principal de un aborto no quirúrgico consiste en la posibilidad de interrumpir el embarazo en la privacidad del hogar de la paciente. Además, se reduce riesgos de complicaciones quirúrgicas. Los efectos secundarios de la Mifepristona y del Misoprostol pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia vaginal intensa, dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda y fatiga. Ocasionalmente, los dolores espasmódicos pueden volverse bastante fuertes, especialmente cuando se está expulsando tejido.

Seguridad

Como en el aborto quirúrgico, existen riesgos de hemorragia. En casos excepcionales, la expulsión incompleta de tejido requiere una evacuación quirúrgica.

Es posible que 1 de cada 1,000 mujeres sufra una infección grave y el fallecimiento a causa de una infección ocurre en menos de 1 de cada 100,000 mujeres. Si presentan malestares similar a la gripe incluyendo debilidad o dolores musculares, con o sin fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea, más de 24 horas después de haber tomado el Misoprostol (Cytotec), es urgente que nos llame inmediatamente. Aunque la probabilidad de infección es baja, le dispensaremos un régimen de antibióticos para 1 semana para reducir su riesgo de infección. Comenzará a tomar antibióticos al final de su próxima comida y seguirá las instrucciones acerca del uso correcto del medicamento. Infórmenos si cree que podría ser alérgica o si sufre alguna otra reacción anormal a este medicamento.

Eficacia y aceptabilidad

La píldora abortiva es efectiva. Es efectiva entre el 92 y el 95% de las veces. Esto quiere decir que de 5 a 8 mujeres de cada 100 necesitarán un procedimiento quirúrgico para interrumpir el embarazo o para detener una hemorragia intensa.

Los efectos secundarios más comunes manifestados por mujeres que tomaron Mifepristona para abortos al comienzo del embarazo son similares a aquellos a un aborto espontáneo: dolores espasmódicos en el útero, hemorragia, náuseas y fatiga. La Mifepristona es segura como un aborto quirúrgico. Este es un procedimiento absolutamente no invasivo que no requiere anestesia. Cytotec es una prostaglandina conocida con el nombre genérico de Misoprostol. Había recibido previamente la aprobación de la FDA para el uso en la prevención de úlceras en pacientes con alto riesgo que tomaban medicamentos antiinflamatorios sin esteroides.

Programación de su cita

Si tiene planeado usar su aseguranza privada o HMO, infórmenos al respecto en el momento de solicitar su cita, para que podamos verificar sus beneficios de seguro antes de su cita.

Si tiene algún problema de salud, alergia a medicamentos o si toma algún medicamento regularmente (inhalador para el asma, insulina, medicamentos para la presión arterial), infórmenos al respecto cuando haga su cita.

Para proteger su confidencialidad, no confirmamos citas por teléfono. Cuando haga su cita, asegúrese de anotar la fecha y la hora elegidas.

Antes de venir

Coma y beba normalmente antes de venir a su cita. Algunas pacientes sentirán un poco de náuseas al tomar la primera píldora. Es menos probable que esto suceda si tiene algo de comida en el estómago antes de tomarla.

Si tiene un inhalador para el asma, tráigalo aunque lo use muy poco. Si toma algún medicamento regularmente, por favor tráigalo.

Le pedimos que no traiga niños a la clínica. Planee pasar de 1 a 2 horas en la clínica.

Traiga su pago completo en efectivo; también puede pagar con Visa, MasterCard, Discover, giro postal, cheque de caja o cheque de viajero. No aceptamos cheques personales. Si usa tarjeta de crédito, la persona con el nombre en la tarjeta debe estar presente para firmar por los cargos. Si su aseguranza o HMO la refiere a nuestra clínica, traiga su tarjeta del seguro, una identificación con foto y la transferencia (si así lo exige su HMO).

La cantidad que paga el primer día incluye la prueba de embarazo, la admisión, la historia clínica y el examen físico, el ultrasonido, los análisis de laboratorio, el MicRhoGAM (si fuera necesaria), los medicamentos necesarios para el procedimiento, la consulta de revisión y toda atención adicional según lo autorizamos. No se incluyen los medicamentos para el dolor.

Acerca de su primera visita

Cuando llegue a la clínica, se le solicitará que complete los formularios de información personal demográfica, de salud y de consentimiento. Un técnico de laboratorio le sacará una muestra de sangre para determinar su factor Rh y el nivel de hierro. Se revisarán sus signos vitales. El profesional médico (un asistente médico o una enfermera especialista) revisará su historia clínica y le hará un examen físico y un ultrasonido transvaginal. Un miembro del personal de admisiones le explicará el procedimiento y la ayudará a completar el resto de los documentos.

Tomará la primera píldora, Mifepristona, en la clínica. Le daremos el Misoprostol, antibióticos y una receta de medicamentos contra el dolor para que se lleve a su casa.

Aunque la mayoría de las mujeres no sufren efectos secundarios después de tomar Mifepristona, algunos de los efectos secundarios posibles son náuseas, dolor de cabeza, sangrado y dolores espasmódicos. Incluso algunas mujeres suspenden el embarazo sólo con Mifepristona, aunque es poco común.

Cuando toma Misoprostol (en casa)

El momento exacto para tomar el misoprostol será el de su elección, dependiendo del trabajo, la escuela, los arreglos de cuidado de los niños o otras situaciones. Haga planes para quedarse en casa durante al menos 12 horas después de tomar Misoprostol.

Es de esperar que tenga hemorragias, coágulos de sangre y dolores espasmódicos. Algunos otros posibles efectos secundarios del Misoprostol son náuseas, diarrea y temperatura elevada. Le daremos medicamentos contra el dolor para ayudarla a sobrellevar el momento. Tendrá libertad para ir a trabajar o a la escuela el día después de haber tomado Misoprostol.

También le entregaremos una hoja de instrucciones con nuestro número telefónico de emergencias, al que puede llamar las 24 horas si tiene preguntas o problemas una vez que se retire de nuestro centro.

Acerca de su consulta de revisión

Le tomarán los signos vitales, le harán un ultrasonido transvaginal y un examen físico y/o análisis de sangre (si fuera necesario). Si desea comenzar con un método anticonceptivo, podremos proporcionarle uno en este momento.